HOMILADORLARDA SIMPTOMSIZ BAKTERIURIYANI BOSHQARISHDA JUFTLIK YONDASHUVI: AKUSHERLIK VA PERINATAL NATIJALAR TAHLILI

Matrizayeva Qurbonbika Madrimovna
Independent researcher, Bukhara State Medical Institute
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-5737-7426
E-mail: Matrizayeva@gmail.com

Dolzarbligi. Homiladorlik davrida simptomsiz bakteriuriya (SB) klinik belgilarisiz kechishi mumkin, biroq u siydik yo‘llari infeksiyalari va ayrim akusherlik asoratlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shu sababli bakteriuriyani o‘z vaqtida aniqlash, qo‘zg‘atuvchini identifikatsiya qilish va antibiotiklarga sezuvchanligini baholash antenatal kuzatuvning muhim yo‘nalishlaridan hisoblanadi. Dissertatsiyada ayolning mikrobiologik holati bilan bir qatorda uning jinsiy sherigining urogenital mikrobiotasini baholash masalasi ham ko‘rib chiqilgan.

Tadqiqot maqsadi. Homiladorlarda simptomsiz bakteriuriyaning epidemiologik va etiologik xususiyatlarini tavsiflash hamda juftliklarda urogenital mikrobiologik tekshiruvning ehtimoliy klinik ahamiyatini yoritish.

Materiallar va usullar. Dissertatsiyada simptomsiz bakteriuriyasi bo‘lgan 80 nafar homilador ayol va 30 nafar sog‘lom homilador ayoldan iborat nazorat guruhi o‘rganilgan. An’anaviy bakteriologik tekshiruvlar, qin mikrobiosenozini baholash uchun Femoflor, erkaklarning urogenital mikrobiotasini baholash uchun Androflor usullari qo‘llangan. Mikroorganizmlarni identifikatsiya qilish va antibiotiklarga sezuvchanlikni baholashda BD Phoenix M50 tizimidan foydalanilgan.

Natijalar. Xorazm viloyatida homilador ayollar orasida bakteriuriya tarqalishi 2021-yilda 19,8%, 2022-yilda 26,2% bo‘lib, taxminan 1,3 baravar oshgan. Escherichia coli asosiy aniqlangan qo‘zg‘atuvchi bo‘lib, uning ulushi 2021-yilda 45,2%, 2022-yilda 33,8% ni tashkil etgan. Nikohdan keyingi dastlabki uch oyda ayollarda kolpit 40,0%, o‘tkir sistit 36,7%, bakterial vaginoz 26,7% va simptomsiz bakteriuriya 16,7% holatda qayd etilgan. Erkaklarda simptomsiz bakteriuriya 10,0% ni tashkil etgan. Dissertatsiyada erkak sherikdagi bakteriuriya darajasi bilan ayollarda gestatsion pielonefrit o‘rtasida musbat korrelyatsiya ($r=0,65$; $p<0,01$) qayd etilgan. Ushbu bog‘liqlik sabab-oqibat munosabatini mustaqil ravishda isbotlamaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari homiladorlarda simptomsiz bakteriuriyani erta aniqlash, qo‘zg‘atuvchilarni mikrobiologik identifikatsiya qilish va antibiotiklarga sezuvchanlikni baholash muhimligini ko‘rsatadi. Ayrim klinik vaziyatlarda jinsiy sherikning urogenital mikrobiotasini ham tekshirish infeksiya bilan bog‘liq omillarni kengroq baholashga yordam berishi mumkin. Juftlikka yo‘naltirilgan yondashuvning samaradorligini tasdiqlash uchun kattaroq, istiqbolli va taqqoslash guruhlari aniq belgilangan tadqiqotlar talab etiladi.

Kalit so‘zlar: simptomsiz bakteriuriya; homiladorlik; mikrobiologik tashxis; Escherichia coli; urogenital mikrobiota; BD Phoenix M50